2.3 在以 OGTT 判断 DM 状态时 HbA1c 与 FPG 诊断敏感性比较 在 218 例 T2DM 患者中,有 22 例 2 h PG < 11.1 mmol/L 而 FPG ≥ 7.0 mmol,在 2 h PG ≥ 11.1 mmol/L 的 196 例中,FPG ≥ 7.0 mmol/L 者为 135 例(68.9%),FPG < 7.0 mmol/L 者 61 例(31.1%),HbA1c ≥ 6.4% 者为 151 例(77.0%),HbA1c < 6.3% 者 45 例(23.0%)。

3 讨 论

目前,DM 诊断主要是测定血浆葡萄糖,包括测定 FPG 和 OGTT。FPG 测定受到多种因素影响,如存在生理波动和日间波动,血液保存温度、时间会影响测定结果等^[3]。此外,ADA 推荐 FPG ≥ 7.0 mmol/L 作为 DM 诊断标准,但一些研究显示其敏感性较低^[4],本研究中采用 ROC 曲线,以 FPG ≥ 7.0 mmol/L 判断 T2DM 时,敏感性为 72.0%;在 218 例 T2DM 患者中,以 FPG ≥ 7.0 mmol/L 检出 2 h PG ≥ 11.1 mmol/L 的敏感性为 68.9%,漏诊率为 31.1%,也提示单用 FPG 作为筛查指标,初诊 DM 可能出现相当一部分患者漏诊。OGTT 仍然是目前临床明确诊断 DM 及糖代谢异常疾病的金标准,但该方法较为繁琐,患者试验前准备不足会影响结果,试验重复性差,不适于大规模人群的筛查^[5]。

HbA1c 是血液中葡萄糖游离醛基与血红蛋白氨基间的非酶缩合产物,其含量高低与红细胞接触的血糖水平及持续时间相关,可反映患者慢性血糖水平,一直是临床用于判断 DM 长期控制情况的良好指标^[6-8]。尽管 HbA1c 测定标准化和一致性尚未完全解决,但 HbA1c 被 ADA 于 2010 年正式列入 DM 诊断指标之一,而目前国内有关 HbA1c 诊断 DM 效能和最佳临床诊断界值的资料不多,本研究采用自动生化分析仪胶乳凝集法测定 HbA1c,结果表明,T2DM 患者 HbA1c 显著高于 IFG、IGT 及 NGT 组($P < 0.01$),本研究得到 HbA1c 临床诊断界值为 6.4%,与 ADA 建议的临床诊断界值 6.5% 很接近。采用 HbA1c ≥ 6.4% 判断 T2DM 时,其敏感性为 77.5%,特异性为 95.0%,前者高于以 FPG ≥ 7.0 mmol/L 判断 T2DM 时的敏感性,用 HbA1c 和 FPG 诊断 T2DM 的 ROC 曲线下面积分别为 0.886 和 0.867,前者略大于后者。本研究中,以 HbA1c ≥

6.4% 检出 2 h PG ≥ 11.1 mmol/L 的敏感率为 77.0%,漏诊率为 23.0%,提示用 HbA1c 作 T2DM 筛查和初诊可较用 FPG 降低漏检率,与参考文献^[9]报道结果一致。初步研究表明 HbA1c 诊断敏感性和诊断性能优于 FPG,用 HbA1c 诊断 DM 不会受到机体应急等因素影响,也较用 FPG 更符合 DM 的定义,胶乳凝集法测定 HbA1c 稳定性好、精确度高,能进行自动分析,可取代 FPG 用于临床 DM 筛查和初诊,对 HbA1c 值高于诊断界值者,应行复查或 OGTT 确诊 DM,对 HbA1c 低于但接近诊断界值者,应进行 OGTT,以确诊糖代谢异常的类型。

参考文献

- [1] Hoelzel W, Miedema K. Development of a reference system for the international standardization of HbA1c/glycohemoglobin determinations[J]. J Int Fed Clin Chem, 1996, 9(2): 62-67.
- [2] Genuth S, Alberti KG, Bennett P, et al. Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus[J]. Diabetes Care, 2003, 26(11): 3160-3167.
- [3] 史丽君. 糖尿病诊断标准体会和应用[J]. 中国实用医药, 2008, 3(3): 83-84.
- [4] 周翔海, 纪立农. 空腹血糖和糖化血红蛋白用于筛查糖尿病的研究[J]. 中华糖尿病杂志, 2005, 13(3): 203-205.
- [5] 曹艳丽, 单忠艳. 糖尿病的诊断标准: OGTT VS HbA1c[J]. 药品评价, 2011, 8(1): 9-11.
- [6] 王笠. 糖化血红蛋白的检测和临床应用[J]. 上海医学检验杂志, 2003, 18(2): 119.
- [7] 周佳焯, 吴炯. 糖化血红蛋白测定在糖尿病诊断和治疗中的应用[J]. 检验医学, 2010, 25(8): 583-587.
- [8] 张清松, 苏衍卿, 陈敏, 等. 血糖、C 肽及糖化血红蛋白间相关性分析[J]. 国际检验医学杂志, 2009, 30(10): 1026-1027.
- [9] 黄开泉, 宁芬, 沈榕. 糖尿病患者 HbA1c 与空腹血糖测定的临床意义[J]. 国际检验医学杂志, 2007, 28(11): 1045-1046.

(收稿日期: 2011-06-09)

• 经验交流 •

输入性恶性疟疾 26 例实验室检测分析

于永敏, 王勇鸣, 冯 煦

(河南省传染病医院检验科, 郑州 450005)

摘要:目的 观察恶性疟疾患者血常规及生化指标变化情况,为临床治疗和判断预后提供依据。方法 收集 26 例外周血镜检阳性的恶性疟疾患者血常规和生化指标结果,与健康体检者 120 例进行对照分析。结果 26 例输入性恶性疟疾患者外周血红细胞、血小板、血红蛋白、红细胞比积均有不同地降低,血清乳酸脱氢酶、总胆红素、直接胆红素明显升高,恶性疟疾患者血常规及生化指标与对照组比较差异有统计学意义($P < 0.05$)。结论 恶性疟疾患者血常规和生化指标的变化情况,与其感染程度及病情转归具有密切关系。

关键词: 疟疾, 恶性; 血常规; 生化指标

DOI: 10.3969/j.issn.1673-4130.2011.20.055

文献标识码: B

文章编号: 1673-4130(2011)20-2408-02

疟疾是全球性虫媒传染病之一,被 WHO 确定为严重危害人类健康的疾病,世界上每年有 3~5 亿人被感染,死亡 100~300 万人。本省作为恶性疟疾的低发区,近年来,随着劳务输出、商务旅游活动的增加,输入性恶性疟疾成为本省疟疾患者增加的主要因素。本研究将本院收治的 26 例恶性疟疾患者血

常规结果及生化指标与 120 例健康人进行了对照分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2009 年 1 月至 2011 年 3 月本院收治住院的恶性疟疾患者 26 例为试验组,年龄 25~45 岁,平均 35 岁,均

为非洲安哥拉、尼日利亚务工回国男性人员。诊断分型采用厚、薄血膜镜检法^[1], 对照组为来本院的男性健康体检者 120 例, 年龄 23~48 岁, 平均 37.5 岁。

1.2 方法

1.2.1 样本处理 采取末梢血制备厚、薄血膜用于诊断和分型, 以乙二胺四乙酸二钾(EDTA-K₂)管抽取静脉血 2 mL 测定血常规, 以真空干燥管抽取静脉血 3~5 mL, 以 3 000 r/min, 离心 10 min 分离血清, 测定生化指标。

1.2.2 检测方法与仪器 厚、薄血膜采用姬姆萨染色法油镜检测。血常规采用希森美康 XE-2100 血球分析仪测定, 试剂由希森美康公司提供。生化指标检测采用美国贝克曼库尔特

UniCel Dx C800 全自动生化分析仪检测, 所需试剂由美国贝克曼库尔特提供。

1.3 统计学处理 采用 SPSS13.0 统计软件进行数据处理, 统计方法为 *t* 检验。

2 结果

2.1 血常规及生化指标结果 以 120 例健康体检者血常规及生化指标为参考范围, 恶性疟疾患者外周血 RBC、PLT、Hb、Hct 不同程度地低于对照组, 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、血清乳酸脱氢酶(LDH)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)不同程度高于对照组, 见表 1、2。

表 1 恶性疟疾患者血常规结果比较($\bar{x} \pm s$)

组别	n	血常规				
		WBC($\times 10^9/L$)	RBC($\times 10^{12}/L$)	PLT($\times 10^9/L$)	Hb(g/L)	Hct(%)
对照组	120	5.98 $\pm$ 1.30	4.55 $\pm$ 0.59*	225.58 $\pm$ 45.89*	140.83 $\pm$ 15.78*	41.01 $\pm$ 4.50*
试验组	26	5.11 $\pm$ 2.11	3.01 $\pm$ 1.00	57.95 $\pm$ 48.91	87.82 $\pm$ 26.77	27.06 $\pm$ 7.57

*: *P*<0.05, 与对照组比较。

表 2 恶性疟疾患者生化指标结果比较($\bar{x} \pm s$)

组别	n	生化指标				
		ALT(U/L)	AST(U/L)	LDH(U/L)	TBIL(μ mol/L)	DBIL(μ mol/L)
对照组	120	29.98 $\pm$ 16.01	22.63 $\pm$ 6.05	164.95 $\pm$ 24.10*	15.02 $\pm$ 7.02*	3.81 $\pm$ 1.70*
试验组	26	61.13 $\pm$ 46.04	65.64 $\pm$ 50.07	526.24 $\pm$ 259.88	44.13 $\pm$ 50.08	22.01 $\pm$ 40.06

*: *P*<0.05, 与对照组比较。

2.2 恶性疟患者外周血涂片结果 见图 1。

图 1 1 例恶性疟患者外周血涂片结果(原虫密度达 30 万/微升)

3 讨论

疟疾是被 WHO 列为对人类危害最严重的三大传染病之一, 而恶性疟疾对人体危害又甚于其他型的疟疾。恶性疟疾原虫寄生于各时期的 RBC, 并能产生严重的原虫血症, 恶性疟疾发作数次后可出现程度不同的贫血, 其主要原因是疟原虫直接破坏 RBC, 脾功能亢进吞噬正常 RBC, 被疟原虫寄生的 RBC 隐形抗原暴露刺激机体产生自身抗体, 造成 RBC 破坏, 宿主也可产生特异性抗体引起 RBC 溶解、巨噬细胞吞噬, 以及骨髓造血功能抑制^[2]。TBIL 与 DBIL 的升高是由于血管内溶血所引起, 而 RBC 的破坏可引起 AST 和 LDH 入血, 出现血中 AST 和 LDH 升高, 故其 Hb、AST 和 LDH 以及 TBIL 检测结果与健康人有显著差异。

河南为非稳定性疟疾地方性流行区^[3], 也是恶性疟疾的低发区, 本院收治的恶性疟患者均为从非洲返回的务工人员, 非洲疟疾 98% 为恶性疟疾, 发病率高于国内, 由于几乎或根本没有免疫力, 造成发热不规律, 临床表现多样化^[4-5], 基于此种原因, 恶性疟疾的诊断主要依靠患者的流行病学史及外周血疟

原虫镜检结果, 而外周血涂片具有准确、价廉和快速的优点, 是目前诊断疟原虫感染的金标准^[6], 检验人员应不断提高镜检水平, 对从高疟区返回的发热患者进行厚、薄血膜染色镜检, 避免漏诊和误诊, 对确诊恶性疟疾的患者, 应动态观察血常规和生化指标的变化情况。由本研究可以说明, 检测 Hb、AST 和 LDH, 对于指导临床的药物使用及预测患者的转归情况, 都具有重要意义。

参考文献

- [1] 叶应妩. 全国临床检验操作规程[M]. 3 版. 南京: 东南大学出版社, 2006: 242-243.
- [2] 沈继龙. 临床寄生虫学与检验[M]. 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2007: 134-135.
- [3] 刘学周, 许汴利. 河南省 1990~2005 年疟疾疫情及防治效果评价[J]. 中国寄生虫与寄生虫病杂志, 2006, 3(24): 226-229.
- [4] World Health Organization. World Malaria Report 2009[R]. Geneva: WHO, 2009: 1-5.
- [5] 白嘉祥, 谭学仁. 非洲疟疾诊治分析[J]. 中国热带医学, 2008, 8(7): 1124-1126.
- [6] 徐建国, 范新建. 临床微生物手册[M]. 7 版. 北京: 科学出版社, 2005: 1910-1912.

(收稿日期: 2011-03-09)